

Volker Otte

Rote Liste und Gesamtartenliste der Flechten (Lichenes) von Berlin

(Bearbeitungsstand: Dezember 2003)

Zusammenfassung: Es wird eine Arten- und Rote Liste der Flechten und lichenicolen Pilze des Landes Berlin (Bundesrepublik Deutschland) vorgelegt. Von den 244 Sippen sind 54 nur historisch nachgewiesen. Die Flora entspricht weitgehend jener von Brandenburg, doch treten in Berlin historisch wie aktuell Arten anthropogener und allochthoner Substrate stärker hervor. Gefährdungen ergeben sich vor allem durch stoffliche Belastungen, Nutzungswandel und Vernichtung der Standorte. In jüngster Zeit hat sich infolge verbesserter Luftqualität die Situation vor allem bei den Epiphyten gebessert, was sich durch Ausbreitung epiphytischer Pionierarten bemerkbar macht.

Abstract: [Red List and checklist of the lichens of Berlin] A species list and Red List of lichens and lichenicolous fungi of the state of Berlin (Federal Republic of Germany) is given. 54 of the 244 taxa are documented only historically. The flora is widely similar to that of the surrounding state of Brandenburg, but in Berlin species of anthropogenous and allochthonous substrates played and still play a remarkable role. Reasons of threat are mainly pollution, change of land use and destruction of the stands. Actually, the situation of epiphytic species has been improved in consequence of better air quality, which is indicated by spreading of epiphytic pioneer species.

1 Einleitung

1.1 Zur Geschichte der lichenologischen Erforschung Berlins

Die Flechtenkunde kann in Berlin auf eine lange Tradition zurückblicken. SCHULZ (1931a) gibt einen Überblick über die Geschichte der Flechtenforschung in der Mark Brandenburg, in der bereits in der älteren Zeit Werke aus dem Berliner Gebiet eine bedeutende Stellung einnehmen. Die erste größere Arbeit mit im Sinne heutiger Taxonomie nachvollziehbaren Artangaben liefert Carl Ludwig Willdenow in seinem „Florae Berolinensis Prodomus“; allerdings sind verschiedene Artansprachen zweifelhaft bzw. die Interpretation einiger von ihm verwendeter Flechtennamen problematisch (WILLDENOW 1787, vgl. SIPMAN et al. 2004). Speziell den Flechten widmete sich dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Berliner Botaniker Gustav Flörke, in dessen ab 1815 herausgegebenem Exsikkatenwerk „Deutsche Lichenen“ zahlreiche Sippen aus dem Berliner Gebiet belegt sind und einige auf der Grundlage dieses Materials erstmals für die Wissenschaft beschrieben wurden. Soweit bei diesen Autoren nicht sogar

konkrete Fundorte angegeben sind, kann bei Angaben wie „bei Berlin“ entsprechend den damaligen Grenzen der Stadt mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass das Material aus dem heutigen Gebiet des Landes Berlin stammt.

Diederich Franz Leonhard v. Schlechtendal führt zahlreiche Flechtenarten ohne nähere Angaben auf (SCHLECHTENDAL 1824). Abgesehen von der mitunter zweifelhaften Richtigkeit der Artansprache kann bei Angaben von Sippen, die – laut dem Titel der Arbeit – „in Mesomarchia, praesertim circum Berolinum“ gefunden wurden, im Einzelfalle nicht mit Sicherheit von Nachweisen im Gebiet des heutigen Landes Berlin ausgegangen werden.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Potsdamer Botaniker Adolf Dufft und Albert Dietrich vielfach im Berliner Gebiet tätig und hinterließen zahlreiche Herbarbelege. Der Potsdamer Botaniker Gustav Egeling veröffentlichte in EGELING (1878 et 1883) neben eigenen Funden aus dem heutigen Südwesten Berlins auch eine Anzahl dieser Funde.

Nach einer längeren Phase mit nur gelegentlicher Aufsammlung von Flechten begannen in den 20er/30er Jahren des 20. Jahrhunderts erneut gezieltere lichenologische Aktivitäten in der Mark Brandenburg, die wiederum in Berlin ihren Ausgangspunkt nahmen. OSTERWALD (1923) erkannte *Scolociosporum chlorococcum* als im Berliner Raum häufige Flechtenart. Der junge Lichenologe Karl Schulz (genannt Schulz-Korth) erforschte die Flechtenvegetation der Mark und beobachtete u. a. die Verdrängung von *Lecanora varia* durch *L. conizaeoides* in Berlin-Dahlem infolge der steigenden Umweltbelastung (SCHULZ 1931a). Auch die Flechtenvegetation des Berliner Naturschutzgebietes Schildow wurde von ihm erforscht (SCHULZ 1931b). Sein früher Tod verhinderte weitere Arbeiten. Der Pankower Lehrer Johannes Hillmann veröffentlichte zahlreiche Beiträge zur Flechtenflora der Mark Brandenburg, in denen auch Berliner Funde nicht fehlen (HILLMANN 1923, 1925, 1926, 1928, 1933, 1936, 1939, 1942). Sein lichenologisches Lebenswerk, eine Flechtenflora der Mark Brandenburg, in der auch Funde aus Berlin aufgeführt sind, konnte infolge der Zeitverhältnisse erst Jahre nach seinem Tode von Vitus Grummann herausgegeben werden (HILLMANN & GRUMMANN 1957).

Die Nachkriegsereignisse brachten die zunehmende Abriegelung der westlichen Stadthälfte und damit auch des botanischen Institutes der Universität vom brandenburgischen Umland. Nach 1961 waren Ausflüge in die Umgebung für die Westberliner Lichenologen jahrelang kaum möglich. So konzentrierten sich die flechtenfloristischen Arbeiten hier auf das Westberliner Gebiet selbst, das auf diese Weise zu einem überdurchschnittlichen Erforschungsstand gelangte. Bis 1989 erschien eine ganze Reihe von Veröffentlichungen (GRUMMANN & POELT 1972, LEUCKERT et al. 1982, LEUCKERT 1983, LEUCKERT & RUX 1984, SEAWARD 1985, GRAF 1986, LEUCKERT & RUX 1988, KÖNIG & SIPMAN 1989). LEUCKERT & RUX (1991) fassen die Ergebnisse der seit 1966 im Westberliner Gebiet getätigten flechtenfloristischen Beobachtungen zusammen und listen 137 während dieser Zeit hier beobachtete Sippen auf.

Die lichenologischen Aktivitäten in der Osthälfte der Stadt waren in dieser Periode gering. Neben dem generellen Mangel an flechtenfloristisch interessierten Personen im brandenburgischen Raum in dieser Zeit mag auch die scheinbar geringe lichenologische Attraktivität des urban geprägten Berliner Gebietes hier eine Rolle gespielt haben. Jedoch war es eben der Aspekt der städtischen Umweltsituation in Verbindung mit den indikatorischen Eigenschaften der Flechten, der bei den wenigen getätigten

Untersuchungen im Vordergrund stand. NATHO (1964) kartiert die Deckungsgrade der Flechtenbewüchse an Straßenbäumen in Ostberlin und dokumentiert außer der Blattflechte *Hypogymnia physodes* neben *Lecanora conizaeoides* auch noch *L. varia*. Weitere Arten wurden gefunden, werden aber nicht benannt. WILKE (1976) weist bei Erfassungen in zwei innerstädtischen Bereichen ausschließlich *Lecanora conizaeoides* nach.

Nach 1990 finden sich flechtenfloristische Daten aus Berlin auch wieder in Veröffentlichungen zur Flechtenflora der Mark Brandenburg (KUMMER et al. 1995, KÜMMERLING 1995, OTTE et al. 1997, RÄTZEL et al. 2002, 2003) und das Berliner Gebiet wird in die aktuellen Kartierungsarbeiten zur brandenburgischen Flechtenflora einbezogen. Zugleich erscheinen weiterhin Arbeiten, die sich speziell auf bestimmte Fundorte oder Standorte innerhalb Berlins beziehen (MEZGER 1996, LEUCKERT & RUX 1999, OTTE 2003). Nicht zuletzt bieten neben der Quadrantenkartierung und den durch Naturschutzfragen initiierten Erfassungen einzelner Flechtenvorkommen die „Tage der Artenvielfalt“ Anlass zu flechtenfloristischen Erhebungen im Berliner Stadtgebiet und erbringen immer wieder neue Artnachweise für die Berliner Flechtenflora.

1.2 Herbarien

Ungünstiger als um Literaturangaben ist es um historisches Belegmaterial zur Berliner Flechtenflora bestellt. Fast alle Herbarbelege in Berlin-Dahlem sind bei dem Bombenangriff im Jahre 1943 vernichtet worden. Lediglich das Material aus der Gattung *Lecanora* war in die Schweiz verliehen und hat auf diese Weise den Krieg überstanden. In erster Linie sind hier Aufsammlungen von Flörke zu nennen. Ferner wird das Flörkesche Exsikkatenwerk „Deutsche Lichenen“ in verschiedenen Herbarien weltweit aufbewahrt. Einige Berliner Flechtenproben von v. Schlechtendal sind im Herbarium der Martin-Luther-Universität in Halle/S. erhalten. Die Herbarien von Dufft und Dietrich befinden sich im Herbar der Universität Potsdam und scheinen die Zeiten weitgehend vollständig überdauert zu haben. Egelingsche Belege sollen sich in Wrocław befinden (SEAWARD 1984, SCHOLZ 1989) und konnten noch nicht eingesehen werden. Einzelne Flechtenproben aus Berlin sind im Staatlichen Museum für Naturkunde Görlitz vorhanden. Nach KRUSE (1994) befinden sich auch im Staatsherbar Hamburg Berliner Flechtenbelege.

Die seit 1945 getätigten Aufsammlungen verschiedener Personen befinden sich in den jeweiligen Privatherbarien sowie vielfach auch im Botanischen Museum in Berlin-Dahlem.

1.3 Flechtenbiotope in Berlin

Durch die großen Eingemeindungen im Zuge der Bildung von Groß-Berlin im Jahre 1920 besteht das Gebiet des heutigen Landes Berlin großflächig aus Wäldern, Gewässern, Mooren und anderen nicht-urbanen Außenbereichen, die zahlreichen hierfür typischen Flechtenarten Habitate bieten oder zumindest früher geboten haben. Dabei sind epiphytische Sippen auf verschiedenen Gehölzen ebenso zu nennen wie Erdflechten sowohl der typischen „märkischen Flechtenheide“ der Sandgebiete als auch der besseren Böden der pleistozänen Hochflächen. Bis in innerstädtische Bereiche sind ferner in Grünanlagen verschiedenen Typs wie Parks, Friedhöfen und Gärten sowie an Straßenbäumen Habitate für Flechten vorhanden. Nicht zuletzt sind hier die zahlreichen Kleingartenanlagen zu nennen, die

mit ihren lichten Obstbaumbeständen günstige strukturelle Voraussetzungen für die Ansiedlung verschiedener epiphytischer Sippen bieten. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen aktuell auch die Gehölzanpflanzungen und -ansiedlungen auf den ehemaligen Rieselfeldern (vgl. OTTE 2003), auf Brachflächen zwischen Bahnanlagen und dergleichen.

Erdflechten nährstoffreicher Standorte (*Peltigera spec.*, *Collema spec.*) finden aktuell noch Habitate auf Friedhofsrasen, ruderalen Brachen, Trittstellen u. a. vor allem im Bereich der reicheren Böden von Barnim und Teltow. Auf den Sanden des Berliner Urstromtales und des vorgelagerten Sandergebietes des Grunewaldes sind die noch vorhandenen Erdflechtenstandorte hingegen durch *Cladonia*-Arten dominiert (vgl. z. B. LEUCKERT & RUX 1999).

Als Habitat für Gesteinsflechten treten natürliche Substrate in Form eiszeitlicher Geschiebe heute stark gegenüber anthropogenen Substraten zurück. Gerade die urban geprägten Bereiche sind hiermit reichlich ausgestattet, wobei basenreiches Kunstgestein (z. B. Beton) eine herausragende Rolle spielt (vgl. MEZGER 1996). Für Silikatflechten finden sich außer auf Ziegeln Standorte beispielsweise auf granitischen Grabsteinen oder Bahnschotter. Allochthones Naturgestein ist neben dem Kunststein vielfach als bedeutendes Substrat verschiedener Flechtensippen in Berlin bekannt geworden (EGELING 1883, GRUMMANN & POELT 1972, SEAWARD 1985).

1.4 Gefährdungsursachen

Nach der Reichsgründung im Jahre 1871 entwickelte sich Berlin zum größten Ballungszentrum Deutschlands, eine Position, die es viele Jahre innehatte. Die hiermit verbundenen beträchtlichen Emissionen von Verbrennungsgasen, Flugaschen und anderen Substanzen aus Industrie und Hausfeuerung vernichteten weitgehend die epiphytische Flechtenflora, die am Ende des 18. Jahrhunderts auch in stadtnahen bzw. heute innerstädtischen Gebieten noch artenreich (vgl. WILLDENOW 1787) und bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zumindest noch mit großen Blatt- und Strauchflechten vertreten war (vgl. EGELING 1878). Zum Ende des 20. Jahrhunderts stellte sich die epiphytische Flechtenflora des gesamten Großraums Berlin infolgedessen stark verarmt dar (SENSTADTUM 1993, MEZGER 1996). Durch Rauchgasreinigung in den Großfeuerungsanlagen, Anschluss zahlreicher Haushalte an die Fernwärmeversorgung, Verringerung des Bedarfs an Heizwärme durch verbesserte Isolierung der Gebäude, Ablösung der Kohle- durch Erdgasfeuerung und nicht zuletzt durch den bedeutenden Rückgang der Industrieproduktion und der überregionalen Schadstoffeinträge ist vor allem seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts die Luftbelastung in Berlin stark zurückgegangen, was seither zu einer lebhaften, noch in vollem Gange befindlichen Wiederansiedlung von Epiphyten führt (z. B. OTTE et al. 1997). Durch die hohe Verkehrsdichte sind allerdings im Berliner Raum nach wie vor überdurchschnittliche Stickoxid-Immissionen festzustellen (LUA 1997), was nährstoffliebende Sippen fördert und oligotraphente bedroht. Deutlich rückläufig ist seit der Abnahme saurer Immissionen die hierdurch einst geförderte *Lecanora conizaeoides*.

Auch Erdstandorte sind durch Immissionen merklich verändert worden. SUKOPP (1999) weist eine sich im weitgehenden Verschwinden basenholder Bodenmoose manifestierende Versauerung während der letzten Jahrzehnte nach.

Nutzungsänderungen in Land- und Forstwirtschaft haben ebenfalls zu Veränderungen der Flechtenflora geführt. Für viele epiphytische Sippen tritt deren Bedeutung gegenüber den Schadstoffimmissionen zwar zurück. Das Überdauern einer ganzen Reihe von Arten in günstig strukturierten Gebieten der Außenbereiche (z. B. GRUMMANN & POELT 1972, LEUCKERT & RUX 1984) zeigt jedoch, dass der Wandel im Waldbild, wie er seit Ablösung historischer Waldnutzungen durch die „ordnungsgemäße Forstwirtschaft“ erfolgt ist, auch im Berliner Gebiet das Seine zum Rückgang epiphytischer Flechten beigetragen hat. Umso mehr ist dies bei Erdflechten offener und halboffener Standorte der Fall, die historisch aus Berliner Wäldern, Heiden und Sandfluren vielfach dokumentiert sind (vgl. EGELING 1878, 1883). EGELING (1882) erwähnt aus der Umgebung der damaligen Stadt Berlin (also zweifellos Gebieten des heutigen Landes Berlin) noch ausgedehnte Flächen offenen Sandes und deren allmähliche Besiedlung durch Erdflechten, vor allem Cladonien. Derartige Bestände sind heute im Gebiet fast nur noch auf einigen ehemaligen Militärf Flächen anzutreffen (vgl. LEUCKERT & RUX 1999).

Die Förderung von Grundwasser zur Deckung des erheblichen Wasserbedarfs von Industrie und Bevölkerung, hydromeliorative Maßnahmen zur Trockenlegung von Bauland, die Einstellung der Rieselwirtschaft sowie der auch großräumige Rückgang des Grundwassers haben in Berlin zu einem beträchtlichen Grundwasserschwind geführt, der sich über das Trockenfallen von Mooren, Feuchtgebieten und Fließen direkt durch Biotopvernichtung und vor allem indirekt durch nachteilige Veränderungen des Mikroklimas negativ auf viele Sippen auswirkt.

Durch Bebauung wurden und werden Flechtenhabitate vernichtet, andererseits oft auch neue geschaffen. Eine artenreiche Flora aus nicht gewöhnlichen Arten stellt sich allerdings meist erst nach längerer Zeit ein. Die Flechten an älteren Gemäuern, Gedenksteinen und dergleichen sind in starkem Maße durch „Sanierungen“ der betreffenden Bauwerke, auch durch nur relativ kurze Standzeiten von Grabsteinen u. a. bedroht. In diesem Zusammenhang müssen auch die allenthalben auftretenden Graffiti sowie die im Kampf hiergegen vorgenommenen Farbanstriche, Waschungen mit Chemikalien etc. genannt werden, die an zahlreichen Gemäuern sowie selbst auf eigentlich günstig gelegenen Findlingsblöcken in Grünanlagen eine normale Flechtensukzession unmöglich machen. Auch Holzzäune u. ä. werden oft durch Anstriche mit Farbe oder Holzschutzmitteln ihrer sonst günstigen Substrateigenschaften beraubt.

2 Methodik

Auf der Grundlage der Auswertung oben genannter Literatur- und Herbar Daten sowie eigener aktueller Erfassungen im Gelände (seit 1994) wurde eine Liste der im Gebiet des Landes Berlin nachgewiesenen Flechtensippen erstellt. Die Nomenklatur richtet sich nach SCHOLZ (2000). Die Gefährdung der einzelnen Taxa wurde als Ergebnis aktueller Erkundungen in verschiedenen Gebieten und Biotoptypen Berlins abgeschätzt. In Tabelle 2 werden zum Vergleich die Neufassung der kommentierten Flechtenliste für Brandenburg (OTTE & RÄTZEL 2004) und die Rote Liste Deutschlands (WIRTH et al. 1996) herangezogen.

Die Zuordnung der Flechten zu Vorzugshabitaten wird anhand der vorgegebenen Kategorien vorgenommen (SAURE & SCHWARZ 2005), wodurch allerdings eine Schematisierung in einer Weise erfolgt,

die die Verhältnisse nur unzureichend zum Ausdruck bringt, da für Flechten das Substrat in vielen Fällen wichtiger ist als der Biotoptyp. So finden sich Betonbesiedler in fast jedem Biotop, sofern Beton vorhanden ist, wie in Berlin vielfach der Fall. Die „biologische Typisierung“ konkretisiert hier die Habitatsprüche. Für eine ökologische Typisierung werden die in Tabelle 1 genannten Symbole verwendet.

Tab. 1: In der Gesamtartenliste verwendete ökologische Typen.

eur	euryök
syn	synanthrop
nit	nitrophil
anit	anitrophil
aci	acidophil
bas	basiphil
neu	neutro- und subneutrophil
hyg	hygrophil
sax	saxicol
ter	terricol
lig	lignicol
bry	epibryisch
epi	epiphytisch

Einige Sippen sind in Berlin generell oder aktuell nur von einzelnen, speziellen Fundorten bekannt geworden, z. B. von basischem Kunstgestein im Botanischen Garten (GRUMMANN & POELT 1972) oder von *Acer negundo*-Anpflanzungen auf ehemaligen Rieselfeldern (OTTE 2003). Es wurde in diesen Fällen davon Abstand genommen, die Biotoptypenkennung bis auf „Botanische Gärten“ bzw. „ehemalige Rieselfelder“ aufzuschlüsseln, da in Anbetracht der wenigen Funde nicht davon ausgegangen werden kann, dass die betreffenden Sippen typischerweise dort auftreten.

Als Modifikationen und Ergänzungen werden neue Abkürzungen eingeführt:

a) zur Liste der Biotoptypen:

- WKL Flechten-Kiefernwälder

b) zur Liste der Gefährdungsursachen:

- 7f: Nutzungsaufgabe auf ehemaligen Militärflächen
- 11e: Vegetationswandel infolge von Nährstoffeinträgen

3 Gesamtartenliste mit Angaben zur Gefährdung (Rote Liste)

Die in Tabelle 2 verwendeten Gefährdungskategorien sind: 0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben bedroht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen, R =

Extrem selten, V = Zurückgehend (Vorwarnliste), D = Daten defizitär. Als zusätzliche Gefährdungskategorie wird die Kategorie D $\uparrow$ eingeführt. Diese bezeichnet ehemals sehr seltene oder verschollene, aktuell in Ausbreitung befindliche, aber immer noch relativ seltene Sippen, deren Gefährdungssituation derzeit schwer abzuschätzen ist (als Spezialfall von „D“ zu betrachten). Eine Unterscheidung zwischen „verschollen“ und „nachweislich ausgestorben“ wird nicht vorgenommen, da sich letztgenannter Nachweis angesichts der bestehenden Dynamik in den wenigsten Fällen führen lässt. „0“ bezeichnet daher alle aktuell nicht mehr nachgewiesenen Sippen.

Der gesetzliche Schutzstatus wird durch folgende Symbole ausgedrückt: § = Besonders geschützt gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), §§ = Streng geschützt gemäß Bundesnaturschutzgesetz. Nähere Angaben sind SAURE & SCHWARZ (2005) zu entnehmen. Dort finden sich auch ausführliche Erläuterungen zu den Vorzugshabitaten und den Gefährdungsursachen (siehe auch Kapitel 2).

Tab. 2: Gesamtartenliste und Rote Liste der Flechten Berlins (BE) im Vergleich zu Brandenburg (BB) und Deutschland (DE) mit Angaben zum gesetzlichen Schutz (GS) (* verweist auf Anmerkung, n. b. = für Deutschland nicht bewertet).

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Acarospora fuscata</i> (NYL.) TH.FR.	3	-	-		PF, AH, AF, OK	sax aci	2c
<i>Acarospora nitrophila</i> H. MAGN.	-	-	-			sax nit	
<i>Acarospora versicolor</i> BAGL. & CA- RESTIA	G	G	G			sax	
<i>Amandinea punctata</i> (HOFFM.) COPPINS & SCHEID.	-	-	-		B	epi nit	
<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) KÖRB. ex A.MASSAL.	0	1	2	§	B	epi neu	11d
<i>Anisomeridium nyssaegenum</i> (ELLIS & EVERH.) R.C.HARRIS	-	-	G		W, PF	epi	
<i>Arthonia lapidicola</i> (TAYLOR) BRANTH & ROSTR.	G	1	3			sax bas	
<i>Aspicilia calcarea</i> (L.) MUDD	G	3	-		O	sax bas	
<i>Aspicilia cinerea</i> (L.) KÖRB.	0	2	-		AF	sax aci	1, 2c, 11d
<i>Aspicilia contorta</i> (HOFFM.) KREMP.	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Aspicilia moenium</i> (VAIN.) G.THOR & TIMDAL	-	-	D		O	sax bas syn	
<i>Bacidia rosella</i> (PERS.) DE NOT.	0	1	1			epi neu	11d
<i>Bacidina arnoldiana</i> (KÖRB.) V.WIRTH & VĚZDA	-	-	-		B, W, P	epi nit	
<i>Bacidina chlorotricula</i> (NYL.) VĚZDA & POELT	D	D	-		B, W, P	epi	
<i>Bacidina egenula</i> (NYL.) VĚZDA	G	D	D			sax	
<i>Bactrospora dryina</i> (ACH.) A.MASSAL.	0	0	1		W	epi	9, 11d

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Baeomyces rufus</i> (HUDS.) REBENT.	3	-	-		W, AT, AW	ter aci	8, 11b, 11d
<i>Bagliettoa baldensis</i> (A.MASSAL.) VĚZDA	G	D	-		P, O	sax bas	2c, 14a
<i>Bryoria fuscescens</i> (GYELN.) BRODO & D.HAWKSW.	3	-	2		W	lig epi aci anit	2a, 11d
<i>Buellia aethalea</i> (ACH.) TH.FR.	-	-	-		PFF, AH, AF	sax aci	
<i>Buellia griseovirens</i> (TURNER & BOR- RER ex SM.) ALMB.	-	-	-		B, P, W	epi	
<i>Calicium adpersum</i> PERS.	2	3	2		W	epi	2a, 9, 11d
<i>Caloplaca cerina</i> (EHRH. ex HEDW.) TH.FR.	0	1	2			epi neu	11d
<i>Caloplaca chlorina</i> (FLOT.) H.OLIVIER	D	D	-		O	sax bas	
<i>Caloplaca citrina</i> (HOFFM.) TH.FR.	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Caloplaca crenulatella</i> (NYL.) H.OLIVIER	-	-	D		O	sax bas syn	
<i>Caloplaca decipiens</i> (ARNOLD) BLOMB. & FORSELL	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Caloplaca flavocitrina</i> (NYL.) WADE	-	-	D		P, O	epi sax bas	
<i>Caloplaca holocarpa</i> (HOFFM. ex ACH.) WADE	-	-	-		O, P, B	sax epi bas	
<i>Caloplaca lobulata</i> (FLÖRKE) HELLB.	0	0	1			epi bas	11d
<i>Caloplaca saxicola</i> (HOFFM.) NORDIN	3	-	-		OKSM	sax bas	2c
<i>Caloplaca teicholyta</i> (ACH.) J.STEINER	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Caloplaca variabilis</i> (PERS.) MÜLL.ARG.	D	D	-			sax bas	
<i>Candelaria concolor</i> (J.DICKS.) STEIN	2	3	2		B, P	epi bas	2a, 11d
<i>Candelariella aurella</i> (HOFFM.) ZAHLEBR.	-	-	-		O, B	sax epi bas syn	
<i>Candelariella reflexa</i> (NYL.) LETTAU	-	-	-		B	epi bas nit	
<i>Candelariella vitellina</i> (HOFFM.) MÜLL.ARG.	-	-	-		AH, AF, O, B	sax epi lig aci nit	
<i>Candelariella xanthostigma</i> (ACH.) LETTAU	3	-	-		B	epi bas	2a
<i>Catillaria lenticularis</i> (ACH.) TH.FR.	D	G	-			sax bas	
<i>Catillaria nigroclavata</i> (NYL.) SCHULER	0	R	3			epi bas	
<i>Cetraria aculeata</i> (SCHREB.) FR.	3	V	3	§	GTS	ter	7f, 8, 11e

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Cetraria ericetorum</i> OPIZ	0	1	2	§	WKL, HZ	ter	7d, 11e
<i>Cetraria islandica</i> (L.) ACH.	0	3	3	§	WKL, HZ	ter	7d, 11e
<i>Chaenotheca chrysocephala</i> (TURNER ex ACH.) TH.FR.	2	3	3		W, PF	epi aci	9, 11d
<i>Chaenotheca ferruginea</i> (TURNER & BORRER) MIG.	-	-	-		W, PF	epi aci	
<i>Chaenotheca furfuracea</i> (L.) TIBELL	0	3	2		W	epi aci	9, 11d
<i>Chaenotheca stemonea</i> (ACH.) MÜLL.ARG.	-	-	2		W, PF	epi aci	
<i>Chaenotheca trichialis</i> (ACH.) TH.FR.	-	-	2		W, PF	epi aci	
<i>Chaenothecopsis pusilla</i> (ACH.) A.F.W.SCHMIDT	R	2	1		MAA	lig aci	2d, 11d, 11e
<i>Cladonia arbuscula</i> (WALLR.) FLOT. ssp. <i>mitis</i> (SANDST.) RUOSS	3	V	n. b.	§	GTS, HZ	ter	
<i>Cladonia arbuscula</i> (WALLR.) FLOT. ssp. <i>squarrosa</i> (WALLR.) RUOSS	3	G	n. b.	§	GTS, WKL, HZ	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia bellidiflora</i> (ACH.) SCHAER.*	0	0	-				Arealgrenze
<i>Cladonia botrytes</i> (K.G.HAGEN) WILLD.	0	1	1		W	lig anit	Arealgrenze
<i>Cladonia caespiticia</i> (PERS.) FLÖRKE	0	3	-		W	ter	11
<i>Cladonia cariosa</i> (ACH.) SPRENG.	2	3	2		RR, GT	ter	7d, 7f, 8e
<i>Cladonia cenotea</i> (ACH.) SCHAER.	1	3	2		MAA, W	lig aci hyg	2d
<i>Cladonia cervicornis</i> (ACH.) FLOT. ssp. <i>pulvinata</i> (SANDST.) AHTI	2	G	n. b.		GTS, HZ	ter	7d, 7f, 8e
<i>Cladonia cervicornis</i> ssp. <i>verticillata</i> (HOFFM.) AHTI	3	V	n. b.		GTS, HZ	ter	7d, 7f, 8e
<i>Cladonia coccifera</i> (L.) WILLD.	-	-	-		RR, GTS, HZ	ter	
<i>Cladonia coniocraea</i> auct.	-	-	-		W	lig epi aci	
<i>Cladonia conista</i> A.EVANS	D	D	D			ter	
<i>Cladonia cornuta</i> (L.) HOFFM.	1	2	2		GTS, HZ, WKL	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia crispata</i> (ACH.) FLOT.	0	0	2		GTS	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia deformis</i> (L.) HOFFM.	2	3	2		GTS, HZ	ter hyg	2d, 7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia digitata</i> (L.) HOFFM.	-	-	-		W	lig epi aci	
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) FR.	-	-	-			eur	
<i>Cladonia foliacea</i> (HUDS.) WILLD.	2	V	3		GTS	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia furcata</i> (HUDS.) SCHRAD.	-	-	-		GTS	ter	

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>ssp. furcata</i>							
<i>Cladonia furcata</i> ssp. <i>subrangiformis</i> (SANDST.) ABBAYES	D	G	3		GTK	ter	
<i>Cladonia glauca</i> FLÖRKE	D	-	-		GTS, HZ	ter	
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) WILLD.	3	-	3		GTS, WKL, WZ	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia humilis</i> (WITH.) J.R.LAUNDON	-	D	-		RR, GTS	ter	
<i>Cladonia macilenta</i> ssp. <i>floerkeana</i> (FR.) V.WIRTH	-	-	n. b.		GTS	ter	
<i>Cladonia macilenta</i> HOFFM. ssp. <i>macilenta</i>	-	-	n. b.		W	lig epi	
<i>Cladonia monomorpha</i> APTROOT et al.	D	G	-			ter	
<i>Cladonia phyllophora</i> HOFFM.	3	-	3		GTS, HZ, WKL, WZ	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia pleurota</i> (FLÖRKE) SCHAEER.	-	-	-		RR, HZ, GTS	ter	
<i>Cladonia polydactyla</i> (FLÖRKE) SPRENG.	-	-	-		W	epi aci	
<i>Cladonia portentosa</i> (DUFOR) COEM.	2	3	3	§	HZ, GTS, WZ	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) HOFFM. ssp. <i>chlorophaea</i> (SOMMERF.) V.WIRTH	-	D	n. b.		RR, HZ, GTS	ter	
<i>Cladonia pyxidata</i> ssp. <i>grayi</i> (G. MERR. ex SANDST.) V.WIRTH	-	-	n. b.		RR, HZ, GTS	ter	
<i>Cladonia ramulosa</i> (WITH.) J.R.LAUNDON	2	-	3		HZ, GTS	ter	7d, 7f, 8e
<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) WEBER ex F.H.WIGG.	1	2	2	§	WKL, HZ, GTS	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia rangiformis</i> HOFFM.	3	3	3		GTK	ter bas	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia rei</i> SCHAEER.	-	-	-		RR	eur	
<i>Cladonia scabriuscula</i> (DELISE) NYL.	3	-	G		GTS	ter	7d, 7f, 8e
<i>Cladonia squamosa</i> (SCOP.) HOFFM.	2	V	-		GTS, HZ, WKL	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cladonia subulata</i> (L.) WEBER ex F.H.WIGG.	-	-	-		RR	eur	
<i>Cladonia uncialis</i> (L.) WEBER ex F.H.WIGG. ssp. <i>biuncialis</i> (HOFFM.) M.CHOISY	3	-	n. b.		GTS, HZ	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Cliostomum griffithii</i> (SM.) COPPINS	D↑	3	3		B	epi	
<i>Collema crispum</i> (HUDS.) WEBER ex F.H.WIGG.	-	-	-		RS	ter bas nit	

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Collema cristatum</i> (L.) WEBER ex F.H.WIGG.	0	0	3			sax bas	14a
<i>Collema fuscovirens</i> (WITH.) J.R.LAUNDON	0	0	-			sax bas	14a
<i>Collema tenax</i> (SW.) ACH. em. DEGEL.	-	-	-		RS	ter bas nit	
<i>Cyphelium notarisii</i> (TUL.) BLOMB. & FORSELL	0	0	1			lig	14a
<i>Dibaeis baeomyces</i> (L.fil.) RAMBOLD & HERTEL	0	2	2		RR, HZ	ter	7d, 7f, 8e, 11
<i>Dimerella pineti</i> (ACH.) VĚZDA	-	-	-		W	ephiph aci hyg	
<i>Diploschistes muscorum</i> (SCOP.) R.SANT.	2	3	3		GTK	bry	7, 8, 11, 14a
<i>Evernia prunastri</i> (L.) ACH.	-	-	-	§	W, B, P	epi	
<i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) HALE	0	D↑	2	§	B, W	epi	11d
<i>Graphis scripta</i> (L.) ACH.	0	3	3		W	epi hyg	2d, 11d
<i>Hyperphyscia adglutinata</i> (FLÖRKE) H.MAYRHOFFER & POELT	0	0	2			epi	11d
<i>Hypocenomyce anthracophila</i> (NYL.) P.JAMES & GOTTH.SCHNEID.	D	D	D		W	epi	
<i>Hypocenomyce caradocensis</i> (LEIGHT. ex NYL.) P.JAMES & GOTTH.SCHNEID.	0	D	-		W	epi	
<i>Hypocenomyce scalaris</i> (ACH. ex LILJ.) M.CHOISY	-	-	-		W	epi aci	
<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) NYL.	-	-	-		W, P	epi	
<i>Hypogymnia tubulosa</i> (SCHAER.) HAV.	-	-	-		W, P	epi	
<i>Hypotrachyna revoluta</i> (FLÖRKE) HALE	0	D↑	2		W, B	epi	11d
<i>Icmadophila ericetorum</i> (L.) ZAHLBR.	0	0	2		W, MA	lig ter anit	2d, 11
<i>Imshaugia aleurites</i> (ACH.) S.L.F.MEY.	D↑	-	3		W	lig epi aci	
<i>Lecania cyrtella</i> (ACH.) TH.FR.	-	-	3		B	epi neu	
<i>Lecania erysibe</i> (ACH.) MUDD	-	D	D		O	sax bas	
<i>Lecania naegelii</i> (HEPP) DIEDERICH & P.Boom	D↑	2	2		B	epi bas	
<i>Lecanora albescens</i> (HOFFM.) BRANTH & ROSTR.	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Lecanora argentata</i> (ACH.) MALME	0	2	2		W	epi	11d
<i>Lecanora campestris</i> (SCHAER.) HUE*	2	3	-		O	sax lig	2c, 11
<i>Lecanora carpinea</i> (L.) VAIN.	D↑	3	3		B	epi neu	

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Lecanora chlarotera</i> NYL.*	D	-	-		B, P	epi neu	
<i>Lecanora conizaeoides</i> NYL. ex CROMBIE*	V	-	-			epi aci	14a, 11d
<i>Lecanora dispersa</i> (PERS.) SOMMERF.	-	-	-		O, B	sax epi bas	
<i>Lecanora expallens</i> ACH.	3	-	-		B, P	epi	2a, 11d
<i>Lecanora hagenii</i> (ACH.) ACH.	-	-	-			epi lig bas	
<i>Lecanora muralis</i> (SCHREB.) RABENH.	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Lecanora polytropa</i> (EHRH. ex HOFFM.) RABENH.	-	-	-			sax aci	
<i>Lecanora populicola</i> (DC.) DUBY	0	0	0			epi neu	
<i>Lecanora saligna</i> (SCHRAD.) ZAHLBR.	-	-	-		B, P	lig epi	
<i>Lecanora subrugosa</i> NYL.	0	3	G		W	epi	11d
<i>Lecanora symmicta</i> (ACH.) ACH.	0	3	3		W	epi aci	11d
<i>Lecanora varia</i> (HOFFM.) ACH.	0	3	2		W, B	lig epi aci	2a, 11d
<i>Lecidea fuscoatra</i> (L.) ACH.	3	V	-			sax	2c, 11
<i>Lecidella elaeochroma</i> (ACH.) M.CHOISY	D↑	3	3		B	epi	
<i>Lecidella scabra</i> (TAYLOR) HERTEL & LEUCKERT	3	3	-			sax	2c
<i>Lecidella stigmathea</i> (ACH.) HERTEL & LEUCKERT.	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Lepraria incana</i> (L.) ACH.	-	-	-		W, P	epi	
<i>Lepraria lobificans</i> NYL.	-	-	-		W, P	epi sax	
<i>Leproloma vouauxii</i> (HUE) J.R.LAUNDON	-	D	3				
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) HOFFM.	0	0	1	§§	W	epi neu	2d, 9, 11d, 12b, 14a, 14b, 14f
<i>Melanelia elegantula</i> (ZAHLBR.) ESSL.	2	-	-		P, B	epi neu	2a, 11d
<i>Melanelia exasperatula</i> (NYL.) ESSL.	-	-	-		W, P, B	epi	
<i>Melanelia glabratula</i> (LAMY) ESSL.	-	-	-		W, P, B	epi	
<i>Melanelia subaurifera</i> (NYL.) ESSL.	-	-	2		W, P, B	epi	
<i>Micarea denigrata</i> (FR.) HEDL.	-	-	-		W, P	lig	
<i>Micarea erratica</i> (KÖRB.) HERTEL et al.	G	D	-			sax	
<i>Micarea prasina</i> FR.	-	-	-			epi lig	
<i>Mycobilimbia fusca</i> (A.MASSAL.) HAFELLNER & V.WIRTH	0	R	2			sax bas	14a

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Mycobilimbia sabuletorum</i> (SCHREB.) HAFELLNER	3	-	-		PF	bry	2c
<i>Ochrolechia microstictoides</i> RÄSÄNEN	2	-	-		W, PF	epi	2a, 11d
<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) ACH.	-	-	-	§	W, PF	epi sax aci	
<i>Parmelia sulcata</i> TAYLOR	-	-	-	§	W, P, B	epi	
<i>Parmelina quercina</i> (WILLD.) HALE	0	0	1	§		epi	11d
<i>Parmelina tiliacea</i> (HOFFM.) HALE	2	3	3	§	B, PF	epi	2a, 11d
<i>Parmeliopsis ambigua</i> (WULFEN) NYL.	-	-	-		W	epi lig aci	
<i>Parmeliopsis hyperopta</i> (ACH.) AR- NOLD	1	-	-		W	epi aci	
<i>Parmotrema chinense</i> (OSBECK) HALE & AHTI	D↑	0	2			epi	
<i>Peltigera didactyla</i> (WITH.) J.R.LAUNDON	-	-	-		RS	ter nit	
<i>Peltigera horizontalis</i> (HUDS.) BAUMG.	0	1	3		W	lig	2d, 9, 11, 12b
<i>Peltigera leucophlebia</i> (NYL.) GYELN.*	0	0	2		W	ter bas	9, 11
<i>Peltigera malacea</i> (ACH.) FUNCK	0	0	1		GTK	ter	7, 8, 11
<i>Peltigera membranacea</i> (Ach.) Nyl.	0	3	3		GZ	ter	7, 11
<i>Peltigera neckeri</i> HEPP ex MÜLL.ARG.	R	2	3		GZ	ter	11
<i>Peltigera polydactylon</i> (NECK.) HOFFM.*	1	1	3			ter	7, 11
<i>Peltigera praetextata</i> (FLÖRKE ex SOMMERF.) ZOPF	0	3	3		W	ter lig epi	2d, 9, 11, 12b
<i>Peltigera rufescens</i> (WEISS) HUMB.	3	-	3		GT, GZ	ter	7, 8, 11
<i>Pertusaria albescens</i> (HUDS.) M.CHOISY & WERNER	2	3	3		PF, W	epi	2a, 9, 11d
<i>Pertusaria amara</i> (ACH.) NYL.	2	3	3		PF, W	epi	2a, 2d, 9, 11d
<i>Pertusaria coccodes</i> (ACH.) NYL.	2	3	3		PF, W	epi	2a, 9, 11d
<i>Pertusaria flavida</i> (DC.) J.R.LAUNDON	0	2	2		PF, W	epi	2a, 9, 11d
<i>Pertusaria hemisphaerica</i> (FLÖRKE) ERICHSEN	2	2	2		PF, W	epi	2a, 9, 11d
<i>Pertusaria pertusa</i> (WEIGEL) TUCK.	0	3	3		PF, W	epi	2a, 9, 11d
<i>Phaeophyscia nigricans</i> (FLÖRKE) MOBERG	-	-	-		B, P, O	sax epi bas nit	
<i>Phaeophyscia orbicularis</i> (NECK.) MOBERG	-	-	-		B, P, O	epi sax bas nit	
<i>Phlyctis argena</i> (SPRENG.) Flot.	3	-	-		W, B, P	epi	2a, 9, 11d
<i>Physcia adscendens</i> (FR.) H.OLIVIER	-	-	-		B, P	epi sax bas nit	

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Physcia aipolia</i> (EHRH. ex HUMB.) FÜNR.	D↑	2	2		B	epi bas	
<i>Physcia caesia</i> (HOFFM.) FÜNR.	-	-	-		O	sax bas nit	
<i>Physcia dubia</i> (HOFFM.) LETTAU	-	-	-		B, P, O	sax epi bas nit	
<i>Physcia stellaris</i> (L.) NYL.	0	-	2		B	epi	11d
<i>Physcia tenella</i> (SCOP.) DC:	-	-	-		B, P	epi bas nit	
<i>Physconia distorta</i> (WITH.) J.R.LAUNDON	0	2	2		B	epi neu	2a, 11d
<i>Physconia grisea</i> (LAM.) POELT	3	-	-		B, PZ	epi sax bas nit	2a, 2c, 11d
<i>Physconia perisidiosa</i> (ERICHSEN) MOBERG	0	3	3			epi, sax	2a, 2c, 11d
<i>Placynthiella dasaea</i> (STIRT.) TØNSBERG	D	D	-		W	lig	
<i>Placynthiella icmalea</i> (ACH.) COPPINS & P.JAMES	-	-	-		RR, W	ter lig	
<i>Placynthiella oligotropha</i> (J.R.LAUNDON) COPPINS & P.JAMES	3	-	3		RR, HZ	ter aci	7d, 7f, 8e, 11
<i>Placynthiella uliginosa</i> (SCHRAD.) COPPINS & P.JAMES	D	-	D			ter	
<i>Placynthium nigrum</i> (HUDS.) S.GRAY	R	R	-			sax bas	14a
<i>Platismatia glauca</i> (L.) W.L.CULB. & C.F.CULB.	3	-	-		W, P	epi aci anit	9, 11d
<i>Pleurosticta acetabulum</i> (NECK.) ELIX & LUMBSCH	0	2	3		B	epi neu	2a, 11d
<i>Polysporina simplex</i> (DAV.) VÉZDA	G	3	3			sax aci	2c, 11
<i>Porina aenea</i> (WALLR.) ZAHLBR.	-	-	-		W	epi hyg	
<i>Protoblastenia rupestris</i> (SCOP.) J.STEINER	G	3	-			sax bas	2c, 14a
<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) ZOPF	-	-	-		P, W	epi lig aci	
<i>Psilolechia lucida</i> (ACH.) M.CHOISY	-	-	-		P	sax	
<i>Punctelia subrudecta</i> (NYL.) KROG.	D↑	D↑	3			epi	
<i>Punctelia ulophylla</i> (ACH.) VAN HERK & APTROOT	D↑	-	-			epi	
<i>Pycnothelia papillaria</i> DUFOUR	0	2	2		RR, GTS, WKL	ter anit	7d, 7f, 8e, 11
<i>Ramalina farinacea</i> (L.) ACH.	3	-	3	§	B, P	epi	2a, 11d
<i>Ramalina fastigiata</i> (PERS.) ACH.	0	2	2	§	B	epi neu	2a, 11d

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) ACH.	0	2	2	§	B	epi neu	2a, 11d
<i>Ramalina pollinaria</i> (WESTR.) ACH.	0	2	2	§	B, OKSM	epi sax neu	2a, 2c, 11d
<i>Rinodina bischoffii</i> (HEPP) A.MASSAL.	D	G	-		O	sax bas	
<i>Rinodina gennarii</i> BAGL.	-	-	-		O, B, P	sax epi bas nit	
<i>Rinodina pityrea</i> ROPIN & H.MAYRHOFER	-	-	-		B, P, O	epi sax bas nit syn	
<i>Rinodina pyrina</i> (ACH.) ARNOLD	D↑	1	2		B	epi bas	
<i>Sarcogyne regularis</i> KÖRB.	-	-	-		O	sax bas	
<i>Scoliciosporum chlorococcum</i> (GRAEWE ex STENH.) VÉZDA	-	-	-			epi lig aci	
<i>Scoliciosporum umbrinum</i> (ACH.) ARNOLD	-	-	-			sax epi	
<i>Staurothele ambrosiana</i> (A.MASSAL.) ZSCHACKE	D	G	-			sax bas	
<i>Stereocaulon condensatum</i> HOFFM.	0	3	2		RR, GTS, WKL	ter anit	7d, 7f, 8e, 11
<i>Stereocaulon incrustatum</i> FLÖRKE*	0	1	0		RR, GTS, WKL	ter anit	7d, 7f, 8e, 11
<i>Stereocaulon nanodes</i> TUCK.	G	R	-		OVG	sax	
<i>Stereocaulon pileatum</i> ACH.	0	R	3		OVG	sax	1, 14a
<i>Stereocaulon tomentosum</i> FR.	0	0	1		RR, GTS, WKL	ter anit	7d, 7f, 8e, 11
<i>Stereocaulon vesuvianum</i> PERS.	G	-	3		OVG, O	sax	1
<i>Strangospora pinicola</i> (A.MASSAL.) KÖRB.	-	-	-			lig aci	
<i>Tephromela atra</i> (HUDS.) HAFELLNER	0	2	3			sax epi neu	11d
<i>Thelidium incavatum</i> MUDD	0	0	-		OKB	sax bas	2c, 14a
<i>Thelomma ocellatum</i> (KÖRB.) TIBELL	R	-	3		G	lig nit	1d, 14a
<i>Toninia aromatica</i> (SM.) A.MASSAL.	0	0	3			sax bas	14a
<i>Trapelia coarctata</i> (SM.) M.CHOISY	-	-	-			sax acid	
<i>Trapelia involuta</i> (TAYLOR) HERTEL	-	-	-			sax acid	
<i>Trapelia obtegens</i> (TH.FR.) HERTEL	-	D	-			sax acid	
<i>Trapelia placodioides</i> COPPINS & P.JAMES	-	3	-			sax acid	
<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (FR.) COPPINS & P.JAMES	-	-	-		W	lig epi acid	

Sippe	BE	BB	DE	GS	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Trapeliopsis granulosa</i> (HOFFM.) LUMBSCH	-	-	-		W, RR, GTS	ter lig epi acid	
<i>Tuckermannopsis chlorophylla</i> (WILLD.) HALE	3	-	-		W, P	epi	11d
<i>Usnea florida</i> (L.) WEBER ex F.H.WIGG.	0	0	1	§	W	epi anit	11d
<i>Usnea glabrescens</i> (NYL. ex VAIN.) VAIN.*	0	0	1	§		epi	11d
<i>Usnea hirta</i> (L.) WEBER ex F.H.WIGG.	3	-	3	§	W, P	lig epi anit	2a, 11d
<i>Verrucaria fuscella</i> (TURN.) WINCH	D	D	D			sax bas	
<i>Verrucaria lecideoides</i> TREVISAN	G	G	3			sax bas	
<i>Verrucaria muralis</i> ACH.	-	-	-		O	sax bas	
<i>Verrucaria nigrescens</i> PERS.	-	-	-		O	sax bas syn	
<i>Verrucaria viridula</i> (SCHRAD.) ACH.	G	D	D			sax bas	
<i>Vulpicida pinastri</i> (SCOP.) MATTSON & M.J.LAI	3	-	3		B, W, P	epi aci	11d
<i>Xanthoparmelia conspersa</i> (ACH.) HALE	0	3	-		AF	sax aci	1, 8, 6e, 11, 14a
<i>Xanthoria candelaria</i> (L.) TH.FR.	-	-	-		B	epi bas nit	
<i>Xanthoria elegans</i> (LINK) TH.FR.	-	-	-		O	sax bas nit	
<i>Xanthoria parietina</i> (L.) TH.FR.	-	-	-		B, P, O	epi sax bas nit	
<i>Xanthoria polycarpa</i> (HOFFM.) RIEBER	-	-	-		B, P	epi nit	

Tab. 3: Gesamtartenliste und Rote Liste der lichenicolen Pilze Berlins (BE) im Vergleich zu Brandenburg (BB) und Deutschland (DE).

Sippe	BE	BB	DE	Vorzugs- habitate	Ökol. Typ.	Gefährdungs- ursachen
<i>Abrothallus parmeliarum</i> (SOM- MERF.) ARNOLD	0	-	-			14g
<i>Sarcopyrenia gibba</i> (NYL.) NYL.	D	D	-			
<i>Scutula miliaris</i> (WALLR.) TREVISAN	0	-	-			14g
<i>Thelocarpon lichenicola</i> (FUCKEL) POELT & HAFELLNER	D	D	-			

Anmerkungen

***Cladonia bellidiflora*:** Für frühere Zweifel an der Authentizität des einzigen bekannten Beleges besteht keine direkte Veranlassung, vgl. RÄTZEL et al. (2003) bzw. OTTE & RÄTZEL (2004).

***Lecanora campestris*:** Diese gewöhnlich auf Gestein siedelnde Sippe ist von Flörke vom Beginn des 19. Jahrhunderts aus Berlin auch von altem Holzwerk belegt.

***Lecanora chlarotera*:** Aktuell im Bereich der Barnimbezirke gebietsweise (Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen) an jüngeren Spitzahornen in Alleen und Grünanlagen; möglicherweise größtenteils durch Anpflanzung eingeführt, aber augenscheinlich seit mehreren Jahren aushaltend.

***Lecanora conizaeoides*:** Diese an stark versauerte Substrate gebundene, im 20. Jahrhundert durch saure Luftbelastung stark geförderte Art ist nach Besserung der Immissionsverhältnisse deutlich rückläufig und von Baumarten mit natürlicherweise hohem pH-Wert bereits weitgehend verschwunden. Diese Tendenz wird vor allem außerhalb der Waldgebiete durch basische und Nährstoffimmissionen verstärkt. Die Art tritt noch verbreitet in Waldbereichen an *Pinus* und *Quercus* auf, doch auch hier mittlerweile oft mit eingeschränkter Vitalität.

***Peltigera leucophlebia*:** Die alten Angaben von *P. aphthosa* beziehen sich mit ziemlicher Sicherheit hierauf, vgl. RÄTZEL et al. (2003) bzw. OTTE & RÄTZEL (2004).

***Peltigera polydactylon*:** Die Einstufung folgt LEUCKERT & RUX (1991).

***Stereocaulon incrustatum*:** Ob alle alten Angaben zutreffen, sei dahingestellt. Der Typus stammt jedenfalls aus dem Gebiet (Schmargendorf) (vgl. OTTE et al. 2000).

***Usnea glabrescens*:** Ob bei dem in HILLMANN & GRUMMANN (1957) erwähnten Beleg tatsächlich das Berliner Zehlendorf gemeint ist, ist nicht ganz sicher. Dieses gehört aber zu den historisch von Lichenologen besammelten Gebieten (vgl. z. B. EGELING 1878), wohingegen für Zehlendorf auf dem Barnim nichts dergleichen bekannt ist.

Zweifelhafte Angaben

In die Liste nicht aufgenommen wurden einige zweifelhaft erscheinende Angaben von WILLDENOW (1787), ferner Sippen, die nur von SCHLECHTENDAL (1824) angegeben werden und bei denen neben Zweifeln an der Identität auch die Frage nach dem Bezug auf das Berliner Gebiet besteht.

Ebenso wurden die Angaben von *Cetraria sepincola* (EHRH.) ACH., *Diploschistes scruposus* (SCHREB.) NORM. und *Protoparmelia badia* (HOFFM.) HAFELLNER aus EGELING (1878) nicht übernommen, da die Zuordnung der angegebenen Fundorte zum Gebiet des Landes Berlin nicht zweifelsfrei vorgenommen werden kann. Die Angabe von *Collema flaccidum* (ACH.) ACH. bei EGELING (1883) erscheint aufgrund der Standortsangabe nicht glaubhaft (vgl. OTTE & RÄTZEL 2004). Die ebendort mit Verweis auf Flörke getätigte Erwähnung von *Leptogium byssinum* (HOFFM.) ZWACKH ex NYL. wird wegen möglicher Verwechslungen, z. B. mit *L. biatorinum* (NYL.) LEIGHT., nicht berücksichtigt.

GRUMMANN & POELT (1972) geben *Caloplaca lactea* (A.MASSAL.) ZAHLBR. aus dem Botanischen Garten an. Nach Sipman (in litt.) liegt wohl eine Verwechslung mit *C. crenulatella* vor.

Die Angaben von *Acarospora glaucocarpa* (ACH.) KÖRB. und *Verrucaria ruderum* DC. aus LEUCKERT & RUX (1991) erwiesen sich im Nachhinein als unsicher (Leuckert mündl.) und wurden daher ebenso weggelassen wie die irrtümliche Angabe der aus Europa nicht nachgewiesenen *Cladonia rappii* A.W.EVANS.

Die Nennung von *Caloplaca flavovirescens* (WULFEN) DALLA TORRE & SARNTH. als auf basischem Kunstgestein (und damit praktisch überhaupt) häufigster Art der Gattung in Berlin bei MEZGER (1996) beruht möglicherweise in unbekanntem Umfange auf Verwechslung mit der in genannter Arbeit nicht aufgeführten, in Berlin nicht seltenen *C. crenulatella*.

Weitere Hinweise zu zweifelhaften Angaben sind OTTE & RÄTZEL (1998) zu entnehmen.

4 Bilanz und Ausblick

Die vorliegende Arbeit stellt die erste Floren- und Rote Liste der Flechten für das Land Berlin dar. Mit LEUCKERT & RUX (1991) lag jedoch bereits eine Rote Liste der Flechten Westberlins vor. Auch wenn eine unmittelbare Gegenüberstellung hierzu wegen des kleineren Bezugsgebietes dieser Arbeit und der dortigen Berücksichtigung lediglich aktuell (seit 1966) nachgewiesener Sippen zur Erfassung von Veränderungen nicht möglich ist, sollen einige Vergleiche vorgenommen werden:

LEUCKERT & RUX (1991) führen 137 für das Gebiet Westberlins mehr oder weniger aktuell nachgewiesene Sippen auf. Durch Ausschluss einiger unsicherer oder irrtümlicher Angaben und durch taxonomische Veränderungen reduziert sich diese Zahl auf 128. In der vorliegenden Liste ist die Zahl der im Gebiet des Landes Berlin nachgewiesenen Sippen auf 240 Flechten und 4 lichenicole Pilze gestiegen. Hiervon sind 54 Taxa nur historisch nachgewiesen und fünf zwischenzeitlich verschollen. Die Zahl der aktuell nachgewiesenen Sippen hat sich somit um 57 Taxa (bzw. 44,5 %) auf 185 erhöht. Die Hälfte des Anstiegs der Artenzahl gegenüber LEUCKERT & RUX (1991) entfällt demnach auf die erstmalige Einbeziehung historischer Nachweise.

Tab.4: Aktuelle Verteilung der Arten auf die Gefährdungskategorien und Vergleich mit LEUCKERT & RUX (1991).

	Kategorien										Arten ge- fährdet	Arten gesamt
	0	1	2	3	G	R	V	D	D↑	-		
aktuelle Bear- beitung [n]	59	5	19	27	12	4	1	17	10	90	126	244
aktuelle Bear- beitung [%]	24,2	2,0	7,8	11,1	4,9	1,6	0,4	7,0	4,1	36,9	51,6	100,0
LEUCKERT & RUX (1991) [n]	0	25	9	4	21	11	0	9	0	49	70	128
LEUCKERT & RUX (1991) [%]	0	19,5	7,0	3,1	16,4	8,6	0	7,0	0	38,3	54,6	100,0

In den Zahlen der in die einzelnen Kategorien gestuften Sippen gibt es z. T. markante Unterschiede zur Liste von LEUCKERT & RUX (1991). Keiner besonderen Erläuterung bedarf die Differenz bei der

früher nicht geführten Kategorie 0. Allerdings müssen fünf bei LEUCKERT & RUX (1991) noch aufgelistete, z. T. schon als „seit längerer Zeit nicht mehr beobachtet“ gekennzeichnete Sippen aktuell als verschollen geführt werden; die restlichen 54 Sippen in der Kategorie 0 ergeben sich jedoch durch die erstmalige Einbeziehung historischer Daten. Drastisch reduziert hat sich trotz beträchtlich erhöhter Anzahl der aktuell nachgewiesenen Sippen die Zahl der vom Aussterben bedrohten Arten. Lediglich in einem Falle (*Mycobilimbia fusca*) ist dies auf Überführung in die Kategorie 0 infolge bereits lange Zeit fehlender Nachweise zurückzuführen. In der großen Mehrzahl der Fälle kann in der neuen Liste die Gefährdung als geringer eingeschätzt werden. Dieser Effekt resultiert zum einen aus dem jetzt fast doppelt so großen Bezugsgebiet, was bei fast allen Sippen der Liste zu einer Erhöhung der Zahl der Nachweise in z. T. weniger gefährdeter Situation geführt hat (z. B. *Phlyctis argena*, *Physconia grisea*). Insbesondere kann aber auch die allgemeine Gefährdung vieler epiphytischer Sippen heute infolge deutlich verbesserter Luftqualität als wesentlich geringer eingeschätzt werden, als dies noch 1991 getan werden musste. Die Veränderungen reichen dabei von einer Herabstufung in Kategorie 2, z. B. für die Vorkommen von *Pertusaria albescens* et *amara* an alten Bäumen auf der Pfaueninsel, bis zu Umstufungen in „ungefährdet“ für neuerdings stark expansive Sippen wie *Candelariella reflexa*, *Evernia prunastri*, *Parmelia sulcata* oder *Melanelia exasperatula*. In ähnlichem Maße weisen auch die Kategorien R und G in dem jetzt größeren Bezugsgebiet der Liste unter verbesserter Umweltsituation starke Abgänge in Richtung schwacher oder gar keiner Gefährdung auf. Trotz Anstieg in den Kategorien 2 und 3 ist daher, ungeachtet der Erhöhung der Anzahl der aktuell beobachteten Sippen, die Zahl der derzeit in verschiedenem Grade gefährdeten Flechten in Berlin insgesamt leicht zurückgegangen. Überproportional gestiegen ist vor allem infolge von Neufunden die Zahl der Taxa, deren Gefährdung noch nicht eingeschätzt werden kann (D und D↑).

Insgesamt hat sich die Gewichtung in der Gefährdung von Flechten in Berlin gegenüber 1991 verschoben: Bei den Epiphyten hat sich die Lage stark entspannt; in höherem Grade gefährdet sind hier fast nur noch typische Besiedler alter Bäume in langfristig standörtlich konstanter Situation. Hingegen ist die Situation bei Erdflechten offener, von bestimmten Nutzungen abhängiger und insbesondere nährstoffarmer Standorte anhaltend kritisch. Beide Kategorien tragen auch stark zum Bestand der aktuell verschollenen Sippen bei.

Fast die Hälfte aller aktuell nachgewiesenen Flechten kann derzeit als ungefährdet gelten. Dieser relativ hohe Anteil beruht einerseits auf der Verbesserung der Situation bei den Epiphyten, in starkem Maße aber auch darauf, dass aufgrund des Gebietscharakters eine große Zahl von Arten (z. T. sicherlich undokumentiert) frühzeitig verschwunden ist und die aktuell verbliebene Flora sich – bei relativ geringer Gesamtartenzahl – zum großen Teil aus unempfindlichen, anthropogen geförderten Sippen, z. B. Betonbesiedlern, zusammensetzt.

Für die Naturschutzpolitik auf dem Gebiet der Flechten in Berlin ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Der Bestand an alten oder sonst durch günstige Habitatstruktur wertvollen Bäumen und Gehölzbeständen (z. B. abständig bestockte Eichenwaldpartien) ist möglichst zu erhalten und in seiner Erneuerung langfristig sicherzustellen; insbesondere soweit es sich um konkret bekannte Fundorte seltener und gefährdeter epiphytischer Arten handelt (vgl. LEUCKERT & RUX 1984). Ebenso

sollte der Verlust der wenigen noch reichen Erdflechtenvorkommen ggf. durch Pflegemaßnahmen verhindert, zumindest aber nicht aktiv durch Aufforstung herbeigeführt werden. Sanierungsmaßnahmen an alten Gemäuern, Denkmälern usw. sind auf das notwendige Minimum zu beschränken, Holzzäune in der Landschaft sind möglichst nicht mit Holzschutzmitteln zu behandeln und erst bei Notwendigkeit und nur in dem erforderlichen Umfange auszubessern. Die Prioritätensetzung in den Schutzbemühungen ist generell nicht in erster Linie an der Bundesartenschutzverordnung, sondern an den Roten Listen auszurichten, da zahlreiche ungefährdete Flechtenarten gesetzlich geschützt, die meisten gefährdeten aber ungeschützt sind. Es erscheint sinnvoll, den Wert von Flechtenvorkommen hierbei nicht nur anhand der Roten Liste Berlins zu ermessen, sondern die Gefährdung der Sippen und damit die Bedeutung der Berliner Vorkommen im größeren Maßstab (Rote Listen Brandenburgs und Deutschlands) abzuschätzen. In verschiedenen Einzelfragen besteht noch Forschungsbedarf, z. B. zur Bedeutung bestimmter Gehölzanpflanzungen auf ehemaligen Rieselfeldern (vgl. OTTE 2003), dem unter Berücksichtigung der derzeitigen hohen Dynamik durch gezielte Untersuchungen Rechnung getragen werden sollte.

5 Danksagung

Dr. Harrie J. M. Sipman (Berlin) und Prof. Dr. Christian Leuckert (Berlin) sei für Hinweise und Ergänzungen zum Manuskript herzlich gedankt.

6 Literatur

- EGELING, G. 1878: Verzeichnis der bisher in der Mark Brandenburg beobachteten Lichenen. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **20**: 17-50.
- EGELING, G. 1882: Lichenes florae marchicae. Die Lichenen der Provinz Brandenburg gruppiert nach Standort und Substrat. Berichte des Botanischen Vereins Landshut **8**: 149-170.
- EGELING, G. 1883: Lichenologische Notizen zur Flora der Mark Brandenburg. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **24**: 1-25.
- GRAF, A. 1986: Flora und Vegetation der Friedhöfe in Berlin (West). Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins **5**: 1-210.
- GRUMMANN, V. J. & POELT, J. 1972: Das Naturschutzgebiet Pfaueninsel in Berlin-Wannsee. V. Die Flechtenflora, mit einer Übersicht über die in den Jahren 1966-1971 im Raum von Berlin (West) beobachteten Flechtenarten. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde (N. F.) **12**: 85-105.
- HILLMANN, J. 1923: Übersicht über die in der Provinz Brandenburg bisher beobachteten Flechten. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **65**: 36-75.
- HILLMANN, J. 1925: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg I. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **67**: 40-49.
- HILLMANN, J. 1926: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg II. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **68**: 189-201.

- HILLMANN, J. 1928: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg III. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **70**: 44-54.
- HILLMANN, J. 1933: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg IV. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **74**: 112-130.
- HILLMANN, J. 1936: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg V. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **76**: 6-21.
- HILLMANN, J. 1939: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg VI. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **79**: 26-37.
- HILLMANN, J. 1942: Zur Flechtenflora der Mark Brandenburg VII. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **82**: 100-107.
- HILLMANN, J. & GRUMMANN, V. 1957 Flechten. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg VIII. Berlin-Nikolassee (Gebrüder Borntraeger), 898 S.
- KÖNIG, P. & SIPMAN, H. J. M. 1989: Das Gründach auf dem ehemaligen Filtergebäude des Wasserwerks Grunewald – ein bedeutender Flechtenstandort. Berliner Naturschutzblätter **33** (4): 129-140.
- KRUSE, A. 1994: Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora der ehemaligen Provinz Brandenburg und Berlins, Untersuchung alter Aufsammlungen aus dem Staatsherbar Hamburg. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Institut für Systematische Botanik und Pflanzengeographie am Fachbereich Biologie der FU Berlin.
- KUMMER, V., KÜMMERLING, H., RÄTZEL, S. & OTTE, V. 1995: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg – eine Anregung zur floristischen Arbeit. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **128**: 229-245.
- KÜMMERLING, H. 1995: Neufunde von Flechten in Berlin und Brandenburg. In: KNOPH, J.-G., SCHRÜFER, K. & SIPMAN, H. J. M. (Hrsg.): Studies in lichenology with emphasis on chemotaxonomy, geography and phytochemistry. Festschrift Ch. Leuckert. Bibliotheca Lichenologica **57**: 347-354.
- LEUCKERT, CH. 1983: Das Naturdenkmal Windmühlenberg in Berlin-Gatow. Bedeutung und Gefährdung der Flechtenflora. Berliner Naturschutzblätter **27**: 9-11.
- LEUCKERT, CH., BURGHause, A. & RUX, K.-D. 1982: Die Flechtenflora (epiphytisch und epigäisch) von Berlin (West). Landschaftsentwicklung und Umweltforschung **11**: 133-139.
- LEUCKERT, CH. & RUX, K.-D. 1984: Epiphytische und epigäische Flechten auf der Pfaueninsel in Berlin-Wannsee. Beobachtungen aus den Jahren 1980 bis 1983. Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins **3**: 123-137.
- LEUCKERT, CH. & RUX, K.-D. 1988: Neufunde von epiphytischen und epigäischen Flechten in Berlin (West) mit einer Bemerkung über schützenswerte Biotope. Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins **6**: 41-46.

- LEUCKERT, CH. & RUX, K.-D. 1991: Die Flechtenflora von Berlin (West) mit besonderer Berücksichtigung epiphytischer und epigäischer Sippen (Rote Liste). In: AUHAGEN, A., PLATEN, R. & SUKOPP, H. (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin. Schwerpunkt Berlin (West). Landschaftsentwicklung und Umweltforschung, Sonderheft **6**: 119-124.
- LEUCKERT, CH. & RUX, K.-D. 1999: Das Trockenrasengebiet im Grunewald Jagen 87 – ein bemerkenswerter Standort für Erdflechten in Berlin. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **132**: 331-339.
- LUA, LANDESUMWELTAMT BRANDENBURG (Hrsg.) 1997: Luftqualität in Brandenburg Jahresbericht 1996. Potsdam.
- MEZGER, U. 1996: Biomonitoring mit epilithischen und epiphytischen Flechten in einem Belastungsgebiet (Berlin). Ein Vergleich. Bibliotheca Lichenologica **63**. Berlin, Stuttgart (Cramer), 164 S.
- NATHO, G. 1964: Die Verbreitung der epixylen Flechten and Algen im Demokratischen Berlin. Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Reihe **13** (1): 53-75.
- OSTERWALD, K. 1923: Über die Verbreitung der Krustenflechte *Bacidia chlorococca* in dem Florenge-
biet von Berlin. Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Brandenburg **65**: 75-79.
- OTTE, V. 2004: Kurzmitteilung: Zur Bedeutung der *Acer-negundo*-Anpflanzungen auf ehemaligen Rieselfeldern für die Berliner Flechtenflora. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **137** (1): 373-374.
- OTTE, V. & RÄTZEL, S. 1998: Kommentiertes Verzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Brandenburgs mit Einschluß Berlins. Vorläufer einer Roten Liste. Gleditschia **26** (1-2): 155-189.
- OTTE, V. & RÄTZEL, S. 2004: Kommentiertes Verzeichnis der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Brandenburgs – zweite Fassung. Feddes Repertorium **115** (1-2): 134-154.
- OTTE, V., RÄTZEL, S. & KUMMER, V. 1997: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg III. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **130**: 259-283.
- RÄTZEL, S., KUMMER, V., OTTE, V. & SIPMAN, H. J. M. 2002: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg VII. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **135**: 139-159.
- RÄTZEL, S., OTTE, V., SIPMAN, H. J. M. & FÜRSTENOW, J. 2003: Bemerkenswerte Flechtenfunde aus Brandenburg VIII. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **136**: 321-340.
- SAURE, C. & SCHWARZ, J. 2005: Methodische Grundlagen. In: DER LANDESBEAUFTRAGTE FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE / SENATSVERWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM.
- SCHLECHTENDAL, D. F. L. v. 1824: Synopsis plantarum cryptogamarum in Mesomarchia praesertim circum Berolinum provenientium. Berolini (Dümmler), 284 S.

- SCHOLZ, P. 1989: Die Flechtenherbarien der DDR. *Boletus* **12** (2): 33-44.
- SCHOLZ, P. 2000: Katalog der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde **31**: 1-298.
- SCHULZ, K. 1931a: Die Flechtenvegetation der Mark Brandenburg. Feddes Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, Beiheft **67**: 1-192.
- SCHULZ, K. 1931b: Die Flechtenvegetation. 20-23 In: HILZHEIMER, M. (Hrsg.): Das Naturschutzgebiet Schildow. Berlin (Neudamm).
- SEAWARD, M. R. D. 1984: Lichen herbarium of Wrocław University. Acta Universitatis Wratislaviensis 666, Prace Botaniczne **29**: 149-162.
- SEAWARD, M. R. D. 1985: A study of saxicolous lichens from selected sites in south-west Berlin (West). Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins **5**: 121-131.
- SENSTADTUM, SENATSVORWALTUNG FÜR STADTENTWICKLUNG UND UMWELTSCHUTZ BERLIN (Hrsg.) 1993: Bioindikation mit Flechten. Monitoringprogramm Naturhaushalt, Heft 2. Berlin, 64 S.
- SIPMAN, H. J. M., LEUCKERT, CH., KNOPH, J.-G., RUX, K.-D. & OTTE, V. 2004: Die Flechten in WILLDENOWS "Florae Berolinensis Prodrum" und ihr Vorkommen im heutigen Berlin. Feddes Repertorium **115**: 121-133.
- SUKOPP, H. 1999: Sandmagerrasen auf urban-industriellen Sekundärstandorten. Beobachtungen im Berliner Gebiet 1952-1998. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg **132**: 221-252.
- WILKE, R. 1976: Die epiphytische Flechtenvegetation in zwei ausgewählten Stadtgebieten Berlins. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Martin-Luther-Universität Halle/Saale.
- WILLDENOW, C. L. 1787: Florae Berolinensis prodromus secundum systema Linnaeanum. Berolini (Vieweg), 439 S. + 7 Taf.
- WIRTH, V., SCHÖLLER, H., SCHOLZ, P., ERNST, G., FEUERER, T., GNÜCHTEL, A., HAUCK, M., JACOBSEN, P., JOHN, V. & LITTERSKI, B. 1996: Rote Liste der Flechten (Lichenes) der Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe für Vegetationskunde **28**: 307-368.

Dr. Volker Otte
 Obersteinweg 2
 02826 Görlitz
 Volker.Otte@smng.smwk.sachsen.de